

第1類医薬品

医薬品を正しく購入するための
説 明 文 書ムシ歯予防薬
クリニカ フッ素メディカルコート

使用前には必ず添付文書をお読み下さい

1	名 称	クリニカ フッ素メディカルコート
2	成分・分量	(1mL 中) フッ化ナトリウム 0.5mg
3	用法・用量	<p>4才以上、5～10mLを用いて <u>1日1回</u>、食後又は就寝前に次の方法により洗口(ブクブクうがい)する。</p> <p>【洗口方法】 本剤1回量を口に含み、歯面に十分ゆきわたるように30秒から1分間洗口(ブクブクうがい)し、吐き出す。 1回量は、年齢等による口腔の大きさを考慮し、通常4～5才で5mL、6才以上で7～10mLである。</p> <p>【用法・用量に関連する注意】</p> <p>(1) 飲みこまないでください(内服薬ではありません。) (2) 定められた用法・用量を厳守してください。 (3) 小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとでご使用ください。 (4) ガラガラうがいではなく、飲みこまないように注意して、洗口(ブクブクうがい)をしてください。 (5) 低年齢児や要介護の方、洗口の経験の少ない方は、水で洗口(ブクブクうがい)の練習を行い、確実に吐き出せることを確認してからご使用ください。 (6) 必ず本品に付属しているプラスチック製計量キャップを使用し、1回量は一度に口に含んでください。 (7) 使用後は口を水などですすがず、また30分間は飲食しないでください(有効成分が口腔内から洗い流され、効果が低減するおそれがあります。) (8) 誤って飲用し、嘔吐、腹痛、下痢などの症状があらわれた場合には、牛乳(無い場合は水)をコップ1～2杯程度摂取し、医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください(嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状をやわらげる効果があります。なお、少量飲んだとしても、これらの症状があらわれない場合は、この処置は必要ありません。)</p>
4	効能・効果	ムシ歯の予防
5	保険衛生上の 危害を防止する ために	<p>次の人は使用しないでください。</p> <p>(1) 4才未満の乳幼児。 (2) 洗口(ブクブクうがい)ができない人。 (3) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <p>・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p>
6	薬剤師が 必要と判断する 事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に役立たせるために必要な情報です。
- 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
- 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗または薬剤師にご相談下さい。