

## クリニカ フッ素メディカルコート

## 使用説明書

この説明文書を読まれる場合は、以下のことにご注意ください。

- この使用説明書はこの薬に関するすべての情報を記載しているものではありません。
- この薬を使用する方に、正しくお使いいただくために必要な情報を簡潔に記載しています。
- さらに詳しいことや、使用時に不安になったり疑問が出てきた場合は医師、歯科医師または薬剤師にお尋ねください。

## ご使用前に

## 事前に確認すべきこと

- 次の人はこの薬を使用することはできません。
  - ・4才未満の乳幼児
  - ・洗口(ブクブクうがい)ができない人
  - ・この薬又はこの薬の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の人は、使い始める前に医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。
  - ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

## 注意事項

- ①使用者が小児の場合、必ず保護者の方がご指導ください。
- ②低年齢児や要介護の方、洗口の経験が少ない方は、お使いいただく前に水で洗口(ブクブクうがい)の練習を行い、確実に吐き出しができるようになってからお使いください。

## ご使用方法

## 使用量及び回数




4才以上、5～10mLを用いて**1日1回**食後又は就寝前に洗口(ブクブクうがい)をします。(使用量の詳細は、薬液の量り方を参照)

※使用し忘れた場合、2回分を1度に使わず、1回の使用量を守ってください。

## 薬液の量り方

薬液は薬剤師の指導のとおり量りましょう。

- ①注ぎ口のPUSHボタンを押し、注ぎ口を開け、1回量を計量キャップに注ぎます。

年齢	6才以上	4～5才	4才未満
1回量	7～10mL 	5mL 	 使用 できません

※1度で口には含むことができ、飲みこまずにブクブクできる量を確認し、口には含むきれずに計量キャップに残った薬液は捨ててください。

※1回量を、必ず添付の計量キャップを用いて量ってください。

- ②使用後は、注ぎ口側を押して閉じてください。

## 【注ぎ口の開け方】



## 洗口方法

洗口は**1日1回**、食後又は就寝前に行ってください。

洗口方法は、必ず薬剤師の指導に従ってください。

- ①1回量を口には込み、薬液が歯面にゆきわたる様に、30秒から1分間**ブクブクうがい**をします。
  - ・1度で口には含むきれずに計量キャップに残った薬液は捨ててください。
  - ・誤って飲みこまないように、下向き加減で**ブクブクうがい**をします。



下向きでの  
ブクブクうがい



上向きでの  
ガラガラうがい

- ②洗口後の液は吐き出してください。吐き出し後は水などですすがないでください。

- ③洗口後30分間は口をすすいだり飲食をしないでください。

※どうしても使用時の香味や刺激が気になる時は、水ですすいでください。ただし、水ですすぐと有効成分が洗い流されてしまい、この薬の効果が低減するおそれがあります。

## Q. 他のフッ化物製剤といっしょに使っても大丈夫?

**A.** 毎日のフッ化物配合ハミガキ剤の使用や学校等での集団フッ化物洗口、又は歯科医院でのフッ化物塗布に加えて使用しても問題は**ありません**。毎日の口腔衛生(歯みがき)にプラスしてお使いください。

## 応急処置

- ①誤って飲んでしまい、嘔吐、腹痛、下痢などの症状があらわれた場合には、コップ1～2杯程度の牛乳(ない場合は水)を飲み、医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。  
※牛乳や水を飲むと嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状をやわらげる効果があります。なお、これらの症状があらわれない場合は、この処置は必要ありません。
- ②多くを使用した場合(過量使用時)、異常を感じたら、医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。

## その他

## ■清潔にお使いいただくために

- ・使用後は、毎回、計量キャップを水ですすぐなど衛生を保ってください。



## ■保存方法について

- ・小児の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(冷蔵庫に入れる必要はありません)



## ■お薬が残ってしまった場合

- ・他の人に渡してはいけません。
- ・余ってしまった場合は捨ててください。

※ご不明な点はライオン(株)お客様センター **0120-813-752** にご相談ください。

HPで詳しい情報を公開しています。 🔍 検索 クリニカ <http://clinica.lion.co.jp>